



Govern d'Andorra

CAMPANYA DE VACUNACIÓ CONTRA LA GRIP

GUIA TÈCNICA 2026

Ministeri de Salut
Andorra la Vella, 4 de setembre del 2026

ÍNDEX

INTRODUCCIÓ	3
ASPECTES OPERATIUS DE LA CAMPANYA DE VACUNACIÓ CONTRA LA GRIP 2026	3
OBJECTIU GENERAL.....	3
OBJECTIUS ESPECÍFICS	3
PERÍODE DE VACUNACIÓ	3
DEFINICIÓ DELS GRUPS ALS QUALS S'ADREÇA LA VACUNACIÓ CONTRA LA GRIP.....	4
LES VACUNES ANTIGRIPALS 2026	6
ADMINISTRACIÓ, PAUTA DE VACUNACIÓ, CONTRAINDICACIONS I EFECTES SECUNDARIS DE LES VACUNES FLUCELVAX® I FLUAD®	6
ELS CENTRES ADMINISTRADORS DE VACUNES	7
DISTRIBUCIÓ DE LA VACUNA ALS CENTRES ADMINISTRADORS	9
VACUNES CONTRA LA GRIP	9
REGISTRE DE LES VACUNES ADMINISTRADES	9
NOTIFICACIÓ DE REACCIONS ADVERSES A LA VACUNA DE LA GRIP I DE LA COVID-19	10
WEBS D'INFORMACIÓ I DE CONSULTA	11
ANNEX 1	12
FULL DE COMANDA DE VACUNES	12

Aquesta vacunació s'adreça principalment a les persones que tenen més risc de patir complicacions a causa de la grip, com són les persones a partir dels 60 anys i les persones de menys edat amb condicions de risc, i les persones que poden transmetre la malaltia a persones de risc, tot i que també s'han definit altres col·lectius susceptibles de rebre la vacunació en campanya.

La implicació i el compromís del personal sanitari en la recomanació d'aquestes vacunacions a les persones vulnerables, d'acord amb les indicacions establertes en aquesta guia, és del tot essencial per assolir els objectius plantejats.

ASPECTES OPERATIUS DE LA CAMPANYA DE VACUNACIÓ CONTRA LA GRIP 2026

OBJECTIU GENERAL

Reforçar la protecció de les persones que formen part dels grups de risc i del personal sanitari i sociosanitari per disminuir la morbimortalitat causada per la grip i contribuir a reduir l'impacte d'aquesta malaltia en la pressió assistencial.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

Assolir una cobertura de vacunes del 90% en la població de 60 anys o més que roman en règim d'institucionalització permanent en els centres sociosanitaris.

Incrementar la cobertura vacunal en la resta de grups de risc, especialment en el de més grans de 60 anys.

Incrementar la vacunació dels treballadors de la salut.

PERÍODE DE VACUNACIÓ

La vacunació començarà el dia 5 d'octubre del 2026 i finalitzarà el 31 de gener del 2027.

DEFINICIÓ DELS GRUPS ALS QUALS S'ADREÇA LA VACUNACIÓ CONTRA LA GRIP

La vacuna serà gratuïta per a les persones que reuneixin les condicions següents:

➤ Grups de població considerats d'alt risc de patir complicacions relacionades amb la grip:

- Persones sanes de 60 anys o més.
- Persones a partir de 6 mesos d'edat que viuen en residències sociosanitàries o institucionalitzades de manera perllongada.
- Persones a partir de 6 mesos d'edat amb algun dels factors de risc que s'assenyalen a continuació:
 - Malaltia cardiovascular crònica greu (com insuficiència cardíaca, miocardiopatia, anomalies congènites amb repercussió clínica, cardiopatia isquèmica o hipertensiva).
 - Malalties respiratòries cròniques (inclou l'asma greu, la displàsia broncopulmonar i la fibrosi quística).
 - Malalties metabòliques cròniques (inclosa la diabetis mellitus).
 - Obesitat mòrbida (IMC > o igual a 40 en adults, ≥ 35 en adolescents o ≥ 3 DE en els infants).
 - Malaltia renal crònica: insuficiència renal crònica, síndrome nefròtica i fallada renal amb necessitat de diàlisi o trasplant.
 - Malaltia hepàtica crònica.
 - Hemoglobinopaties i anèmies. Hemofília, trastorns hemorràgics crònics i receptors d'hemoderivats i transfusions múltiples.
 - Immunosupressió (inclosa l'originada per la infecció pel VIH, per fàrmacs com els corticoides –inclòs el tractament amb eculizumab–, per trasplantaments o per quimioteràpia).
 - Asplènia anatòmica o funcional.
 - Malalties neurològiques i neuromusculars greus.
 - Càncer i hemopaties malignes.
 - Implant coclear.
 - Fístula de líquid cefalorraquidi.
 - Malaltia celíaca o malaltia inflamatòria crònica.
 - Trastorns i malalties que comporten disfunció cognitiva: síndrome de Down, demències i altres.

- Menors, entre 6 mesos i 18 anys, amb tractament de llarga durada amb àcid acetilsalicílic, pel risc de desenvolupar una síndrome de Reye després de la infecció gripal.
- Infants entre 6 mesos i 2 anys d'edat amb antecedents de prematuritat (de < 32 setmanes de gestació).
- Persones embarassades, independentment del seu estat de gestació.

➤ ***Persones que poden transmetre la malaltia a individus d'alt risc:***

- Personal sanitari o sociosanitari que presta atenció assistencial a pacients de risc, incloses les oficines de farmàcia.
- Persones que prestin assistència domiciliària a persones d'alt risc.
- Estudiants en pràctiques en centres sanitaris o sociosanitaris.
- Persones que treballen en centres sanitaris i sociosanitaris en centres o institucions tancades i que tenen contacte amb pacients d'alt risc, persones grans o persones institucionalitzades.
- Persones que conviuen a la llar, inclosos infants a partir dels 6 mesos d'edat, amb altres que pertanyen a alguns dels grups d'alt risc, per la seva condició clínica especial.

➤ ***Persones que treballen en serveis comunitaris essencials:***

- Personal de serveis comunitaris essencials (bombers, policia, protecció civil, agents de circulació).

➤ ***Persones internes i persones que treballen en el Centre Penitenciari.***

➤ ***Persones amb una exposició laboral directa a aus domèstiques, porcs o bestiar boví, i també a aus i altres animals salvatges. La finalitat és reduir l'oportunitat de coinfecció de virus humà i aviari o porcí, i disminuir la possibilitat de recombinació genètica d'ambdós virus.***

En cas que els professionals mèdics creguin convenient vacunar persones no incloses en els grups de risc, aquesta vacunació haurà de seguir els circuits habituals de prescripció, compra i administració.

Es recorda la indicació de vacunar els viatgers internacionals no vacunats que vagin a zones amb presència de grip aviària, i els viatgers internacionals que presenten més risc de complicació de grip, per la seva edat o condició clínica especial, que no han

estat vacunats durant la temporada gripal i que es dirigeixen a zones tropicals en qualsevol època de l'any o a l'hemisferi sud durant els mesos d'abril a setembre.

LES VACUNES ANTIGRIPALS 2026

La composició de les vacunes contra la grip que ha recomanat l'Organització Mundial de la Salut per a la temporada 2026-2027 a l'hemisferi nord és la següent:

a. Vacuna a partir d'ous (inactivades o atenuades)

- Soca similar a: A/Missouri/11/2025 (H1N1)pdm09
- Soca similar a: A/Darwin/1454/2025 (H3N2)
- Soca similar a: B/Tokyo/EIS13-175/2025 (línatge B/Victoria)

b. Vacuna a partir de cultius cel·lulars:

- Soca similar a: A/Missouri/11/2025 (H1N1)pdm09
- Soca similar a: A/Darwin/1415/2025 (H3N2)
- Soca similar a: B/Pennsylvania/14/2025 (línatge B/Victoria)

Per a la campanya de vacunació contra la grip estacional 2026, les vacunes adquirides pel Ministeri de Salut (MS) han estat:

- FLUCELVAX® vacuna inactivada de cultiu cel·lular per a persones de 6 mesos a 59 anys d'edat.
- FLUAD® vacuna inactivada adjuvada per a persones a partir de 60 anys d'edat

Totes dos són vacunes que contenen les tres soques recomanades per l'OMS per a la temporada 2026-2027.

ADMINISTRACIÓ, PAUTA DE VACUNACIÓ, CONTRAINDICACIONS I EFECTES SECUNDARIS DE LES VACUNES FLUCELVAX® I FLUAD®

Vegeu la fitxa tècnica de les vacunes:

Fitxa tècnica de FLUCELVAX®

https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/1241879001/FT_1241879001.html

Fitxa tècnica de FLUAD®

https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/1241878001/FT_1241878001.html

Cal respectar les indicacions d'ús de cadascuna de les vacunes disponibles i la seva indicació segons l'edat.

Cal recordar que no es poden administrar vacunes antigripals als nens de menys de 6 mesos d'edat.

En infants de 6 mesos a 8 anys amb condicions de risc que tinguin indicada la vacunació, si no hi ha antecedents de vacunació s'administraran dos dosis amb un interval mínim de quatre setmanes. Si hi ha antecedents de vacunació, s'administra una única dosi.

La vacuna contra la grip inactivada (de dosi estàndard, d'alta càrrega i adjuvada) es pot administrar de manera concomitant, en llocs anatòmics diferents, amb la vacuna Arexvy®.

Pel que fa a l'administració de la vacuna antigripal i la vacuna contra la COVID-19, no és necessari que hi hagi interval de temps entre les dos vacunes i es poden administrar de manera concomitant, en llocs anatòmics diferents.

Les vacunes contra la grip es poden administrar de manera concomitant amb les vacunes contra el pneumococ, l'herpes zòster, i el tètanus i la diftèria, en llocs anatòmics diferents.

La immunosupressió, l'embaràs i la lactància no són contraindicacions per a la vacuna contra la grip inactivada.

No es coneixen contraindicacions mèdiques per vacunar persones que han superat la COVID-19 i, en principi, no cal esperar un temps específic després de la malaltia per vacunar contra la grip o per a altres vacunes (excepte per a la vacuna contra la COVID-19).

ELS CENTRES ADMINISTRADORS DE VACUNES

ASPECTES GENERALS

Es recomana aprofitar el contacte amb el centre sanitari per valorar l'estat vacunal de les persones.

CENTRES ADMINISTRADORS SEGONS GRUP DE RISC

Pel que fa a les persones que treballen en els serveis comunitaris essencials i a les persones internes i els treballadors del Centre Penitenciari, s'organitzarà un circuit específic per administrar-los la vacuna contra la grip, de manera que les persones susceptibles de vacunació rebran informació de les seves direccions respectives de quin és el procediment que cal seguir.

La resta de la població susceptible de vacunació que pertany a un grup de risc pot rebre les vacunes contra la grip en:

- Residències sociosanitàries. Durant el període de campanya aquests establiments es fan càrrec d'administrar la vacuna a les persones residents i als professionals sanitaris i sociosanitaris que hi treballen. Per això cal comptar amb la conformitat de la persona i/o la indicació del metge corresponent.
- El SAAS es farà càrrec de gestionar la vacunació dels professionals sanitaris i sociosanitaris que hi treballen.
- La Xarxa de Centres d'Atenció Primària i de Centres de Salut del SAAS es fa càrrec d'administrar les vacunes sense necessitat de prescripció mèdica a totes les persones de 60 anys o més que ho sol·licitin, durant el període de campanya. Per això disposen d'un permís especial, per vacunar d'acord amb el protocol establert i sense la prescripció mèdica corresponent.

En el cas de les persones menors de 60 anys que formen part d'un grup de risc, hauran de posar-se en contacte amb el seu metge referent per demanar les prescripcions de les vacunes. El metge les farà a la història clínica, de manera que els centres d'atenció primària les tindran disponibles i no caldrà anar a la consulta del metge.

Les persones que no pertanyen a cap grup de risc i que vulguin rebre la vacuna contra la grip necessiten la prescripció mèdica tant per adquirir la vacuna a les oficines de farmàcia com perquè els sigui administrada als centres d'atenció primària.

- L'Hospital Nostra Senyora de Meritxell es fa càrrec d'administrar les vacunes a les persones ingressades que pertanyen a un grup de risc.

Els centres administradors han de complir els requisits exigits en l'article 7 del Reglament que regula el pla de vacunacions sistemàtiques obligatòries, del 20 de juny del 2007.

DISTRIBUCIÓ DE LA VACUNA ALS CENTRES ADMINISTRADORS

VACUNES CONTRA LA GRIP

La farmàcia Roser Miró serà el centre proveïdor de les vacunes contra la grip i, per tant, l'encarregada de fer-ne la distribució a tots els centres administradors amb l'autorització prèvia dels responsables del ministeri, i de garantir que la vacuna arribi als llocs d'administració amb totes les condicions de seguretat.

La farmàcia Roser Miró lliurarà les vacunes als centres administradors, segons el procediment següent:

- Els centres administradors de vacunes han de fer arribar el full de comanda de vacunes (annex 1) per correu electrònic, a l'adreça farmaciamiro@andorra.ad, a la farmàcia Roser Miró abans de la data prevista per al lliurament de les vacunes.
- Si a les 13 hores del dia anterior al lliurament no s'ha rebut el full de comanda corresponent, es considerarà que no es necessiten vacunes.
- El subministrament de vacunes s'ha de fer seguint el calendari de lliurament de vacunes següent:
 - El 30 de setembre i 1 d'octubre
 - El 7 i 8 d'octubre
 - El 21 i 22 d'octubre
 - El 4 i el 5 de novembre
 - El 18 i 19 de novembre
 - El 2 i el 3 de desembre

Posteriorment al 3 de desembre, si algun centre administrador necessita més vacunes, les ha de demanar per correu electrònic a la farmàcia Roser Miró, que en coordinarà el lliurament.

REGISTRE DE LES VACUNES ADMINISTRADES

Per controlar les vacunes administrades i avaluar-ne la cobertura, cal que els administradors de vacunes omplin el registre d'administració amb les dades que hi consten i d'acord amb el que estableix l'apartat B de l'article 8 del Reglament que regula el pla de vacunacions. Així doncs, per ser centre administrador de vacunes contra la grip és condició necessària garantir que es durà a terme el registre d'administració de vacunes a la història clínica compartida.

Carnet de vacunes

Sempre que sigui possible s'ha de consignar, en el carnet de vacunes de la persona a qui s'administra la vacuna, la data d'administració, el número de lot i la signatura i el segell de l'administrador al lloc disponible per a altres vacunes amb el nom de "grip" i especificar el tipus de vacuna administrada.

NOTIFICACIÓ DE REACCIONS ADVERSES A LA VACUNA DE LA GRIP I DE LA COVID-19

En cas que es detectin reaccions adverses no habituals, cal fer una declaració a l'Àrea de Recursos Sanitaris del Ministeri de Salut, mitjançant el lloc web de Salut, <https://webapps.govern.ad/RAM/>

WEBS D'INFORMACIÓ I DE CONSULTA

- WHO. Influenza seasonal. https://www.who.int/health-topics/influenza-seasonal#tab=tab_1
- WHO. Europe. Influenza seasonal. https://www.who.int/europe/health-topics/influenza-seasonal#tab=tab_1
- WHO. Recommended composition of influenza virus vaccines for use in the 2026-2027 northern hemisphere influenza season. World Health Organization, feb 2026. <https://www.who.int/news/item/27-02-2026-recommendations-for-influenza-vaccine-composition-for-the-2026-2027-northern-hemisphere-seasonason>
- ECDC. Seasonal influenza. <https://www.ecdc.europa.eu/en/seasonal-influenza>
- CDC. Influenza (Flu). <https://www.cdc.gov/flu/index.html>
- Vaccination Infoservice. Grippe. <https://vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/Grippe>
- Ministerio de Sanidad. Vacunación ferente a gripe y Covid-19. https://www.sanidad.gob.es/areas/promocionPrevencion/vacunaciones/gripe_covid19/home.htm

FULL DE COMANDA DE VACUNES



Govern d'Andorra
Ministeri de Salut

CAMPANYA DE VACUNACIÓ CONTRA LA GRIP

FULL DE COMANDA DE VACUNES ANTIGRIPALS

Nom del centre que fa la comanda

.....

Data de la comanda:

Nombre de vacunes necessàries:

Flucelvax:

Fluad:

Signatura

Cal fer arribar el full de comanda de vacunes per correu electrònic, a l'adreça farmaciamiro@andorra.ad, a la farmàcia Roser Miró abans de les 13 hores del dia anterior al lliurament.