

Una espècie invasora

La vespa asiàtica (*Vespa velutina nigrithorax*) és una espècie exòtica invasora originària d'Àsia que va ser descoberta per primera vegada a França l'any 2004 i des d'aleshores s'ha anat expandint per Europa.

A Andorra és considerada com a exòtica invasora per la legislació vigent.

Aquesta espècie, que ha arribat suposadament de forma natural a Andorra, és una amenaça per a les explotacions apícoles i altres insectes autòctons, com també les explotacions de producció de fruita.

La picada és molt similar a la d'altres vespes o abelles i per tant les persones al·lèrgiques han de dirigir-se a un centre mèdic. Les persones no al·lèrgiques han de tenir cura en cas de picades múltiples.

Si trobem un niu o vesper no ens hi hem d'aproximar, hem d'avisar el Cos de Banders (148), que protegirà la zona i enretirà el vesper.



 **148**



El Govern emprèn les accions necessàries per controlar la seva proliferació i evitar tant com es pugui la colonització del territori per pal·liar els danys que causa.

Més informació a
www.mediambient.ad
www.banders.ad



La vespa asiàtica

(*Vespa velutina*)

Espècie exòtica invasora



Govern d'Andorra

Cicle biològic de l'espècie

El cicle de la vespa asiàtica comença a finals d'hivern, quan la vespa i reina fundadora, després de passar un hivern en estat de latència o diapausa, s'activa i busca un lloc protegit per construir un niu embrionari, que sol tenir la mida d'un ou de gallina (febrer-març). Es denomina niu embrionari perquè la reina fundadora s'encarrega de les tasques de fer el niu amb fibres de fusta mastegada i pondre les primeres postes de vespes obreres, que a mesura que vagin creixent s'ocuparan de les tasques de recol·lecció, alimentació, neteja i cura de les larves i construcció d'un vesper més gran sobre el niu embrionari.



Niu embrionari

Aquest vesper eixamplat, de la mida d'una pilota d'handbol, sobre el niu embrionari s'anomena vesper primari (abril-maig). El niu embrionari i el vesper primari els podem trobar sempre en llocs protegits de les inclemències del temps (sota teulades, armaris, registres de comptadors). Així com el niu embrionari només disposa de la reina fundadora, el vesper primari, amb la reina només dedicada a pondre, ja té vespes obreres que el defensaran i per tant s'ha d'anar amb precaució.



Vesper primari

Com que els llocs on se situa el vesper primari no permeten un creixement del niu, generalment les vespes es traslladen gradualment per fer un niu secundari fins que el primari queda abandonat.

El vesper secundari se sol situar en capçades d'arbre a més de 10 metres d'alçària però també se n'ha trobat en matolls, falsos sostres, sotateulades i pilones d'electricitat. Un vesper secundari tindrà vespes obreres i vespes reines.



Vesper secundari

Aquestes vespes reines són fecundades entre finals de setembre i octubre, i van abandonant el vesper secundari. De les vespes reines fecundades (200-500) en sobreviuran entre l'1 i el 5% per iniciar un niu embrionari l'any següent.

Com reconèixer una vespa asiàtica

